

# 六年级学生接种乙型肝炎(HBV) 疫苗

该疫苗将在学校为11-12岁学龄童接种

## 这种疫苗的作用是什么？

乙肝疫苗保护肝脏免受乙肝病毒感染。对部分人群来说，这种病毒感染不会消失。这可能导致：

肝损害  
肝癌  
死亡

## 在学校接种乙肝疫苗的三个原因

1

**有效！** 乙肝疫苗可以有效预防乙肝感染所致和引发的其他严重损害健康的后果。

2

**安全！** 加拿大有确保疫苗安全的机构。给孩子注射乙肝疫苗比之后感染乙肝更安全。

3

**简单！** 在您签署和返还同意后，会有一名护士给您的孩子接种疫苗，您无需自己带孩子去接种疫苗。

**注意事项：** 如果您的孩子错过了在学校接种疫苗的机会，请联系当地公共健康部门。

## 疫苗可能带来的副作用

感觉疲惫或不适，或易怒（轻易不安）

发烧，头痛

流鼻涕

嗓子痛，咳嗽

皮疹

胃部不适、呕吐、大便稀溏（腹泻）、丧失食欲

注射部位红、肿、痛

疫苗副作用是常见的，其中大多数症状是轻微的，并在数日内消失。

如果您的孩子出现不良反应，您应该：

- 用凉的湿布冷敷注射部位
- 给孩子服用止痛散热的药物

# 六年级学生接种人乳头状瘤病毒(HPV-9)疫苗



该疫苗将在学校为11-12岁学龄童接种

## 这种疫苗的作用是什么？

HPV-9 疫苗保护免受九种常见的人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染后可能导致的：

- 头颈部癌症
- 子宫颈和阴道癌
- 肛门癌
- 阴茎癌
- 生殖器疣

## 在学校接种HPV疫苗的三个原因

1

**有效！** HPV感染非常常见。HPV疫苗可以有效预防该感染引发的癌症和其他严重损害健康的后果。

2

**安全！** 加拿大有确保疫苗安全的机构。给孩子注射HPV疫苗比感染该病毒更安全。

3

**简单！** 在您签署和返还同意后会有有一名护士给您的孩子接种疫苗，您无需自己带孩子去接种疫苗。

**注意事项：** 如果您的孩子错过了在学校接种疫苗的机会，请联系当地公共健康部门。

## 疫苗可能带来的副作用

发烧

感觉头晕或疲倦

头痛

身体疼痛

嗓子痛


注射部位红、肿、痛

胃部不适、呕吐、或大便稀溏（腹泻）

疫苗副作用是常见的，其中大多数症状是轻微的，并在数日内消失。

如果您的孩子出现不良反应，您应该：

- 用凉的湿布冷敷注射部位
- 给孩子服用止痛散热的药物



# 九年级学生接种丙型脑膜炎(MenC-ACYW) 疫苗

该疫苗将在学校为13-15岁学龄童接种

## 这种疫苗的作用是什么？

**MenC-ACYW 疫苗**可以有效保护您的孩子免受脑膜炎球菌感染导致的流行性脑膜炎。这种疾病可能导致：

- 耳聋
- 癫痫
- 脑损伤
- 失去一侧的手臂或下肢

## 疫苗可能带来的副作用

感觉疲惫或不适，或易怒（轻易不安）

头痛和/或身体疼痛

皮疹

胃部不适、呕吐、大便稀溏（腹泻）、丧失食欲

注射部位红、肿、痛

疫苗副作用是常见的，其中大多数症状是轻微的，并在数日内消失。

如果您的孩子出现不良反应，您应该：

- 用凉的湿布冷敷注射部位
- 给孩子服用止痛散热的药物

## 在学校接种乙肝疫苗的三个原因

1

**有效！** MenC-ACYW 疫苗可以有效预防该感染所致疾病和疾病引发的其他严重损害健康的后果。

2

**安全！** 加拿大有确保疫苗安全的机构。给孩子注射MenC-ACYW疫苗比感染该病毒更安全。

3

**简单！** 在您签署和返还同意后会有有一名护士给您的孩子接种疫苗，您无需自己带孩子去接种疫苗。

**注意事项：** 如果您的孩子错过了在学校接种疫苗的机会，请联系当地公共健康部门。



# 九年级学生接种破伤风白喉百日咳(dTap)疫苗



该疫苗将在学校为13-15岁学龄童接种

## 这种疫苗的作用是什么？

dTap 疫苗为您的孩子提供对三种严重疾病的免疫保护：

- 白喉：一种鼻咽部感染
- 破伤风：一种神经系统的感染
- 百日咳：一种肺部和呼吸道感染

## 在学校接种乙肝疫苗的三个原因

1

**有效！** dTap疫苗可以有效预防感染所致疾病和疾病引发的其他严重损害健康的后果。

2

**安全！** 加拿大有确保疫苗安全的机构。给孩子注射dTap疫苗比感染该病毒更安全。

3

**简单！** 在您签署和返还同意书后会有一名护士给您的孩子接种疫苗，您无需自己带孩子去接种疫苗。

**注意事项：** 如果您的孩子错过了在学校接种疫苗的机会，请联系当地公共健康部门。

## 疫苗可能带来的副作用

头晕

感觉疲惫或不适  
或易怒（轻易不安）

头痛和//或身体疼痛

淋巴结肿大

皮疹

胃部不适、呕吐、  
大便稀（腹泻）、  
失去饥饿感

注射部位红、  
肿、痛

疫苗副作用是常见的，其中大多数症状是轻微的，并在数日内消失。

如果您的孩子出现不良反应，您应该：

- 用凉的湿布冷敷注射部位
- 给孩子服用止痛散热的药物

