

Vaccin Hépatite B (VHB) pour les élèves de 6e année

Ce vaccin sera proposé à l'école aux enfants âgés de 11 à 12 ans.

Quel est l'effet de ce vaccin ?

Le vaccin **VHB** protège contre le virus de **l'hépatite B** qui cause une infection du foie. Chez certaines personnes, cette infection ne disparaît pas. Elle peut causer :

- Des lésions du foie
- Un cancer du foie
- La mort

3 raisons d'être vacciné contre le VHB à l'école

1

Ça marche! Le vaccin contre le VHB est très efficace pour prévenir les infections qui pourraient rendre votre enfant très malade et causer de graves problèmes de santé.

2

C'est sûr! Le Canada a un très bon système de sécurité des vaccins. Il est beaucoup plus sûr pour votre enfant de recevoir le vaccin contre le VHB que d'être infecté.

3

C'est simple! Une infirmière vaccinera votre enfant à l'école si vous signez et renvoyez les formulaires de consentement. Vous n'aurez pas à le faire vacciner vous-même.

Note: Si votre enfant n'a pas reçu ce vaccin à l'école, contactez le service de santé publique de votre région.

Effets secondaires possibles des vaccins

Fatigue, malaise ou irritabilité(s'énervé facilement)

Fièvre, mal de tête

Nez qui coule

Mal de gorge, toux

Éruption

Sentiment de nausée, vomissements, selles molles (diarrhée), manque d'envie de manger

Rougeur, gonflement, douleur à l'endroit de l'aiguille

Les effets secondaires des vaccins sont fréquents. La plupart sont légers et disparaissent en quelques jours.

Si votre enfant a des effets secondaires, vous pouvez:

- Mettre un linge frais et humide là où il a été piqué
- Donner un médicament contre la douleur et la fièvre

Vaccin VPH-9 pour les élèves de 6e année

Ce vaccin sera proposé à l'école aux enfants âgés de 11 à 12 ans.

Quel est l'effet de ce vaccin ?

Le **vaccin VPH-9** protège contre 9 souches courantes du papillomavirus humain (VPH), un virus qui peut causer:

- Le cancer de la tête et du cou
- Le cancer du col de l'utérus et du vagin
- Le cancer de l'anus
- Cancer du pénis
- Verrues génitales

3 raisons d'être vacciné contre le VPH à l'école

1

Ça marche! Le VPH est très courant et son vaccin est très efficace pour prévenir les infections qui pourraient causer des cancers et d'autres problèmes de santé graves.

2

C'est sûr! Le Canada a un très bon système de sécurité des vaccins. Il est beaucoup plus sûr pour votre enfant de recevoir le vaccin contre le VPH que d'être infecté.

3

C'est simple! Une infirmière vaccinera votre enfant à l'école si vous signez et renvoyez les formulaires de consentement. Vous n'aurez pas à le faire vacciner vous-même.

Note: Si votre enfant n'a pas reçu ce vaccin à l'école, contactez le service de santé publique de votre région.

Effets secondaires possibles des vaccins

Fièvre

Sentiment de vertige ou de fatigue

Mal de tête

Maux de corps

Mal de gorge

Rougeur, gonflement, douleur à l'endroit de l'aiguille

Sentiment de nausée, vomissements, selles molles (diarrhée), manque d'envie de manger

Les effets secondaires des vaccins sont fréquents. La plupart sont légers et disparaissent en quelques jours.

Si votre enfant a des effets secondaires, vous pouvez:

- Mettre un linge frais et humide là où il a été piqué
- Donner un médicament contre la douleur et la fièvre

Vaccin MenC-ACYW pour les élèves de 9e année

Ce vaccin sera proposé à l'école aux enfants âgés de 13 à 15 ans.

Quel est l'effet de ce vaccin ?

Le **vaccin MenC-ACYW** protège votre enfant contre les bactéries responsables de la **maladie méningococcique**. Cette maladie peut causer :

- **Surdit **
- **Crises d' pilepsie**
- **L sions c r brales**
- **La perte d'un bras ou d'une jambe**

Effets secondaires possibles des vaccins

Fatigue, malaise ou irritabilit  (s' nervier facilement)

Maux de t te et/ou Maux de corps

 ruption

Sentiment de naus e, vomissements, selles molles (diarrh e), manque d'envie de manger

Rougeur, gonflement, douleur   l'endroit de l'aiguille

Les effets secondaires des vaccins sont fr quents. La plupart sont l gers et disparaissent en quelques jours.

Si votre enfant a des effets secondaires, vous pouvez:

- Mettre un linge frais et humide l  o  il a  t  piqu 
- Donner un m decin contre la douleur et la fi vre

3 raisons de faire ce vaccin   l' cole

1

 a marche! Le vaccin MenC-ACYW est tr s efficace pour pr venir les infections qui pourraient rendre votre enfant tr s malade et causer de graves probl mes de sant .

2

C'est s r! Le Canada a un tr s bon syst me de s curit  des vaccins. Il est beaucoup plus s r pour votre enfant de recevoir le vaccin MenC-ACYW que d' tre infect .

3

C'est simple! Une infirmi re vaccinera votre enfant   l' cole si vous signez et renvoyez les formulaires de consentement. Vous n'aurez pas   le faire vacciner vous-m me.

Note: Si votre enfant n'a pas re u ce vaccin   l' cole, contactez le service de sant  publique de votre r gion.

Vaccin dTap pour les élèves de 9e année

Ce vaccin sera proposé à l'école aux enfants âgés de 13 à 15 ans.

Quel est l'effet de ce vaccin ?

Le **vaccin dTap** protégera votre enfant contre 3 maladies graves appelées:

- **Diphtérie** : infection du nez et de la gorge
- **Tétanos** : infection du système nerveux
- **Coqueluche** : infection des poumons et des voies respiratoires

3 raisons de faire le vaccin dTap à l'école

1

Ça marche! Le vaccin dTap est très efficace pour prévenir les infections qui pourraient rendre votre enfant très malade et causer de graves problèmes de santé.

2

C'est sûr! Le Canada a un très bon système de sécurité des vaccins. Il est beaucoup plus sûr pour votre enfant de recevoir le vaccin dTap que d'être infecté.

3

C'est simple! Une infirmière vaccinera votre enfant à l'école si vous signez et renvoyez les formulaires de consentement. Vous n'aurez pas à le faire vacciner vous-même.



Note: Si votre enfant n'a pas reçu ce vaccin à l'école, contactez le service de santé publique de votre région.

Effets secondaires possibles des vaccins

Sentiment de vertige

Fatigue, malaise ou irritabilité (s'énerver facilement)

Maux de tête et/ou Maux de corps

Ganglions lymphatiques enflés

Éruption

Malaise à l'estomac, vomissements, selles molles (diarrhée), absence de faim

Rougeur, gonflement, douleur à l'endroit de l'aiguille

Les effets secondaires des vaccins sont fréquents. La plupart sont légers et disparaissent en quelques jours.

Si votre enfant a des effets secondaires, vous pouvez:

- Mettre un linge frais et humide là où il a été piqué
- Donner un médecin contre la douleur et la fièvre